



在臺工作外國人預防HIV感染，鼓勵定期篩檢



真實感染案例

某50歲受聘僱外國人來臺工作三年多，因身體不適、發燒就醫，後病情惡化、昏迷(弓漿蟲腦炎)，住進加護病房(確診HIV感染)，遠在母國家人非常擔憂其病情、無法就近照顧...


來臺工作前，於母國接受HIV篩檢

- 建議受聘僱外國人來臺前先接受HIV篩檢，了解自身健康狀況；**如為HIV感染者，建議留在母國接受治療至穩定控制病情**
- 感染HIV之外國人在臺服藥治療費用須自付**

- (約新臺幣20萬元/年)，如已加入我國健保者，在臺服藥兩年後治療費用，依健保給付規定辦理
- 若在臺確診HIV，可留臺繼續工作，雇主不得以**感染HIV為由遣返或解約**。
- 建議感染者積極接受治療，穩定控制病情。

在臺期間預防及定期篩檢HIV

安全性行為	建議篩檢頻率
全程使用保險套及水性潤滑液	<ul style="list-style-type: none">曾有性行為者至少1次有不安全性行為者至少每年1次若有感染風險行為(如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等)，則建議每3至6個月檢驗1次



HIV/AIDS 預防、篩檢及治療等相關衛教資訊

如確診HIV，請積極接受治療！

- 若在臺確診HIV，可留臺繼續工作，雇主不得以**感染HIV為由遣返或解約**。
- 建議感染者積極接受治療，穩定控制病情。



Prevent HIV Infection and Encourage Regular Screening For Foreign Workers

New Southbound Health Center
新南向人員健康服務中心
Taiwan CDC & NTUH

Real Case

A 50-year-old foreigner who had been employed in Taiwan for more than 3 years sought medication attention due to discomfort and fever. His condition deteriorated and was in coma due to toxoplasmosis. He was admitted to the ICU and was tested with HIV-positive results. His family at his home country were worried about his condition but could not take care of him from afar.


Before arriving at Taiwan for work,
receive HIV screening tests at home country

- It is recommended to receive HIV screening tests at one's home country before arriving in Taiwan for work. **If tested positive for HIV, one should remain in their home country to receive treatment screening tests in their home country to ascertain their health conditions.**

The government does not offer foreigners AIDS treatment subsidies for the first 2 years. **The treatment costs approximately NT\$200,000 (about US\$7,000) each year.** However, those who have records of paid medication in Taiwan and join Taiwan's national health insurance after 2 years of medication in Taiwan will be able to apply for the said subsidies as regulated by the National Health Insurance Administration (NHI).

Prevention for HIV during the stay in Taiwan and HIV Screening Test Recommendations

Safety Sex Practices
Usage of condoms and water-based lubricants is recommended throughout the process.



- **Ones with sexual experience, screening test for at least once per year is recommended.**
- Ones with unsafe sex, screening test for at least once per year is recommended.
- If engaged in risky behavior such as sharing needles, multiple sexual partners, combined usage of addictive drugs, sexual transmitted diseases, etc., it is recommended to screen once every 3 to 6 months.



HIV/AIDS Prevention, screening and treatment information

If you are diagnosed with HIV, please receive treatment actively!

- If diagnosed with HIV-positive results in Taiwan, working in Taiwan will remain legally allowed. **Employers are not allowed to deport or terminate the employ permit due to HIV-positive results.**
- It is strongly recommended that infected individuals actively receive treatment in order to stabilize and control their disease.



Mencegah infeksi HIV dan mendorong pemeriksaan rutin HIV bagi Pekerja Asing di Taiwan

New Southbound Health Center
新南向人員健康服務中心
Taiwan CDC & NTUH




Contoh kasus nyata

Seorang perkerja asing berusia 50 tahun yang bekerja di Taiwan selama lebih dari 3 tahun berobat ke dokter karena ketidaknyamanan fisik dan demam. Kemudian, kondisi dia memburuk dan mengalami koma (Toksoplasmosis). Dia dirawat di unit perawatan intensif (karena dikonfirmasi menderita HIV). Keluarga dia sangat khawatir, namun tidak dapat menemani dan merawat di sisi dia karena terlalu jauh...

Perilaku seksual yang aman

Gunakan kondom setiap saat dan pelumas berbahar dasar air



Melakukan pemeriksaan HIV di negara asal sebelum datang bekerja ke Taiwan

• Disarankan agar pekerja asing melakukan pemeriksaan HIV di negara asal sebelum datang bekerja ke Taiwan untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing diri. **Bila terinfeksi HIV, disarankan untuk tinggal di negara asal untuk melakukan perawatan dan pengobatan hingga kondisinya terkendali dan stabil.**

- Orang asing yang terinfeksi HIV harus membayar biaya pengobatan dan perawatan medis di Taiwan sendiri (sekitar 200 ribu NTD per tahun).

Bagi yang telah memiliki NHI (Asuransi Kesehatan) Taiwan, biaya perawatan setelah dua tahun menggunakan obat di Taiwan akan ditangani sesuai dengan peraturan pembayaran dari jaminan NHI Taiwan.

Mencegah HIV dan melakukan pemeriksaan HIV secara rutin selama di Taiwan

Ajurran frekuensi pemeriksaan

- Bagi yang pernah melakukan hubungan seksual minimal 1 kali.
- Bagi yang berperilaku seksual tidak aman, minimal 1 tahun 1 kali.

- Bila ada perilaku berisiko tinggi (seperti menggunakan jarum suntik yang sama dengan orang lain, berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan obat narkotika, berpenyakit menular seksual, dll.) diarjurkan untuk melakukan pemeriksaan setiap 3~6 bulan sekali.

Pencegahan HIV/AIDS, pemeriksaan dan pengobatan serta informasi kesehatan lainnya



Bila dikonfirmasi menderita HIV, harap untuk melakukan pengobatan secara aktif

- Bila didiagnosis menderita HIV, **pekerja asing dapat tetap bekerja di Taiwan. Majikan tidak diperbolehkan untuk memulangkan atau mengakhiri kontrak kerja dengan alasan pekerja terinfeksi HIV**
- Disarankan agar pasien yang terinfeksi melakukan pengobatan secara aktif untuk menstabilkan dan mengendalikan kondisi penyakit.



Người nước ngoài làm việc tại Đài Loan nên phòng ngừa lây nhiễm HIV, khuyến khích sàng lọc thường xuyên

Trường hợp lây nhiễm thực tế

Một người nước ngoài 50 tuổi được nhận đến đài loan lao động và đã làm được 3 năm . Do cơ thể không khỏe bị sốt đã đến khám bác sỹ , bệnh trở nặng, hôn mê(Viêm não Toxoplasma),phải ở phòng chăm sóc đặc biệt (xác định nhiễm HIV),bố mẹ ở quê đã rất lo lắng về bệnh tình , nhưng không ở bên chăm sóc.....

Nên sàng lọc HIV tại quê nhà trước khi sang Đài Loan làm việc


- Khuyến khích người lao động nước ngoài nên chấp nhận kiểm tra sàng lọc HIV để hiểu rõ về tình trạng sức khỏe của bản thân; **nếu bạn bị nhiễm HIV, nên ở lại quê nhà để điều trị cho đến khi tình trạng được kiểm soát ổn định**
- Người nước ngoài bị nhiễm HIV tại Đài Loan phải tự chi trả chi phí điều trị (khoảng 200.000 Đài tệ/năm), đối với những người đã tham gia bảo hiểm y tế đài loan, chi phí điều trị sau 2 năm uống thuốc tại Đài Loan, sẽ được xử lý theo quy định bảo hiểm y tế**

Phòng ngừa HIV và sàng lọc thường xuyên trong thời gian lưu trú tại Đài Loan

tình dục an toàn

Sử dụng bao cao su trong suốt quá trình và chất bôi trơn dạng nước

- **Người đã có quan hệ tình dục ít nhất một lần**
Người có quan hệ tình dục không an toàn ít nhất một năm một lần
- Nếu có các hành vi có nguy cơ lây nhiễm (như dùng chung kim tiêm với người khác, quan hệ tình dục với nhiều người, dùng chung các loại thuốc gây nghiện, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục...) thì nên xét nghiệm định kỳ 3 đến 6 tháng một lần.



Thông tin giáo dục sức khỏe về dự phòng, sàng lọc và điều trị HIV/AIDS

Nếu bạn bị chẩn đoán nhiễm HIV, hãy tích cực chấp nhận điều trị!

- Nếu bạn bị chẩn đoán nhiễm HIV ở Đài Loan, bạn có thể ở lại Đài Loan và tiếp tục làm việc, và **người sử dụng lao động không được phép đuổi hoặc chấm dứt hợp đồng với lý do nhiễm HIV**.
- Khuyến cáo người nhiễm bệnh tích cực điều trị, để tình trạng bệnh ổn định và trong kiểm soát.



中华人民共和国卫生部疾病预防控制中心
新南向人道健康服务中心
新南向人道健康服务中心
新南向人道健康服务中心

检验结果出来前

如果您是第一次进行HIV检测，建议您在检测后等待3周再进行复检。如果您的检测结果为阳性，建议您立即寻求专业医疗帮助，并遵循医生的治疗和管理建议。

如果您是第一次进行HIV检测，建议您在检测后等待3周再进行复检。如果您的检测结果为阳性，建议您立即寻求专业医疗帮助，并遵循医生的治疗和管理建议。

如果您是第一次进行HIV检测，建议您在检测后等待3周再进行复检。如果您的检测结果为阳性，建议您立即寻求专业医疗帮助，并遵循医生的治疗和管理建议。

如果您是第一次进行HIV检测，建议您在检测后等待3周再进行复检。如果您的检测结果为阳性，建议您立即寻求专业医疗帮助，并遵循医生的治疗和管理建议。

检测结果出来后

如果您是第一次进行HIV检测，建议您在检测后等待3周再进行复检。如果您的检测结果为阳性，建议您立即寻求专业医疗帮助，并遵循医生的治疗和管理建议。

如果您是第一次进行HIV检测，建议您在检测后等待3周再进行复检。如果您的检测结果为阳性，建议您立即寻求专业医疗帮助，并遵循医生的治疗和管理建议。

如果您是第一次进行HIV检测，建议您在检测后等待3周再进行复检！

如果您是第一次进行HIV检测，建议您在检测后等待3周再进行复检。如果您的检测结果为阳性，建议您立即寻求专业医疗帮助，并遵循医生的治疗和管理建议。